



JUNIO
2026

DELFIN NARIZ DE BOTELLA

Un delfín cosmopolita y robusto. En Chile, destaca una población residente costera en torno al complejo Chañaral-Choros, monitoreada por años.

NOMBRE CIENTÍFICO: *Tursiops truncatus* (Montagu, 1821)
NOMBRE COMÚN: delfín nariz de botella / delfín mular

GRUPO: Mamíferos marinos (Cetacea)
FAMILIA: Delphinidae

?

¿CÓMO RECONOCERLO?

Rasgos generales:

- Cuerpo robusto y rostro corto, bien diferenciado del “melón”.
- Aleta dorsal alta, falcada y ubicada hacia la zona media del cuerpo; aletas pectorales curvadas y en punta.
- **Coloración:** grises en dorso y lados, aclarando hacia el vientre (a veces rosado); puede presentar manchas circulares naturales en la piel.

1-1,3 m cría / 1,9-3,8 m adulto

NOTA: en Chile se sugiere hablar de morfotipos (p. ej., oceánico y costero) por falta de información suficiente para “ecotipos” formales.

Tamaño:

- **Crías al nacer:** 1-1,3 m.
- **Adultos:** 1,9-3,8 m (machos levemente mayores).

📍


¿DÓNDE VIVE?

En Chile: registros desde Arica (~18°S) hasta ~46°S (registro confirmado más austral), e incluye islas oceánicas como San Félix y San Ambrosio, Juan Fernández e Isla Salas y Gómez.

Registro de avistamientos en aguas chilenas.

ZONAS DE AVISTAMIENTO MÁS FRECUENTES:

- Mayor parte de avistamientos en el norte: entre Mejillones y Arica (marzo a noviembre) y también entre Valparaíso y Mejillones (junio).
- Presencia relevante de población residente en Coquimbo: islas Chañaral y Choros, monitoreada por ~20 años.



🌿

HÁBITAT Y ECOSISTEMA

- **Sus preferencias de hábitat son dinámicas:** puede encontrarse en zonas costeras, pelágicas y dentro de fiordos.
- Se han confirmado avistamientos en límites de la surgencia costera de Mejillones, en islas costeras (complejo Chañaral-Choros), en canales y fiordos norpatagónicos, y en el sector pelágico de Valdivia (al norte de Punta Galera).
- En Chile se describen al menos dos morfotipos con rasgos ecológicos distintos:
 - **Costero:** individuos de 2,5-3 m y grupos típicos de 50-100.
 - **Oceánico:** algunos superan 4 m y pueden formar grupos de más de 1.000 individuos.

💬

POBLACIÓN Y MONITOREO

- En islas Chañaral y Choros se ha estimado una población residente de 50-55 animales.
- Mediante foto-identificación, se han reconocido 124 individuos, con 45 asociados a la agrupación residente; además, algunos han sido registrados por 10-15 años, sugiriendo alta fidelidad de sitio.

🛡️

CONSERVACIÓN

Estado (referencias históricas citadas en la ficha):

- **UICN (1994):** Datos Insuficientes.
- **CITES:** Apéndice II.

Clasificación RCE (Chile):

- **“Pod costero” (Atacama-Coquimbo):** EN PELIGRO (EN) C2a(i,ii); D, por estimación de <40 individuos maduros y concentración en una sola localidad (entre islas Choros, Damas y Chañaral), entre otros elementos del criterio.
- **Resto de la población en Chile:** Preocupación Menor (LC), por no cumplir umbrales de categorías de riesgo según los criterios aplicados.

