



JULIO
2026

CÓNDOR ANDINO

El ave planeadora emblemática de los Andes: Un gran buitre, de reproducción lenta, que anida en acantilados y comparte dormideros ("condoreras").

NOMBRE CIENTÍFICO: *Vultur gryphus* (Linnaeus, 1758)
NOMBRE COMÚN: Cóndor andino

GRUPO: Aves (Clase Aves)
FAMILIA: Cathartidae

ORDEN: Falconiformes
GÉNERO: Vultur

¿CÓMO RECONOCERLO?


Rasgos clave (adultos): plumaje negro, con superficie dorsal de secundarias y cobertoras secundarias parcialmente blancas, y collar blanco de plumas en el cuello.



DIMORFISMO SEXUAL:

- Macho con cresta; peso 11-15 kg.
- Hembra sin cresta; peso 8-11 kg.

Madurez sexual: alrededor de los 6 años.



¿DÓNDE VIVE?

Distribución general: desde Venezuela hasta el extremo sur de Chile (Cabo de Hornos), asociada a la Cordillera de los Andes.
En Chile: ocupa todo el territorio, incluyendo Andes, acantilados costeros del norte, cordillera de la costa (zona central), costa de fiordos y estepa patagónica en el extremo sur.



ALIMENTACIÓN:

- Se alimenta principalmente de carroña de vertebrados de talla media a grande.
- Se describe que antiguamente dependía de camélidos silvestres, pero actualmente su dieta deriva principalmente del ganado doméstico.
- También se describe uso de basurales y rellenos sanitarios como fuente de alimento en Chile central, especialmente en invierno.



HÁBITAT Y ECOSISTEMA

- **Hábitat preferente (Chile):** mayor frecuencia de avistamiento entre 1.000-2.000 m.s.n.m., en zonas con presencia de riscos/acantilados.
- **Relación con el paisaje:** gran parte de Chile es descrita como adecuada; la presencia se concentra especialmente donde hay altas pendientes, media altitud, nieves y glaciares, y vegetación rala.
- **Usos de suelo más utilizados (orden decreciente):** nieves y glaciares, sin vegetación, y praderas y matorrales.
- **Ambientes poco usados (según muestreo citado):** zonas agrícolas, urbanas e industriales no registraron presencia de individuos.
- **Condoreras (dormideros comunales):** fuera del territorio reproductivo, se congrega en dormideros comunales (roqueríos con oquedades y repisas) usados como refugio, descanso diurno y pernocte.



REPRODUCCIÓN Y COMPORTAMIENTO:

- Es monógamo y forma parejas de por vida; nidifica en cuevas de acantilados.
- **Territorio de nidificación exclusivo de la pareja:** 2-4 km².
- **Tasa reproductiva muy baja:**
 - interacción previa a la puesta 8-9 meses,
 - 1 huevo por postura,
 - incubación ~60 días,
 - permanencia del pollo en el nido 6-8 meses,
 - dependencia del juvenil tras abandonar el nido de ~1 año.
- En el mejor de los casos, la reproducción ocurre cada dos años (o más, según oferta de alimento).

POBLACIÓN Y MONITOREO

- En un muestreo nacional citado (757 puntos), se registraron 543 cóndores en vuelo; en la muestra, 79,3% fueron adultos y 20,7% inmaduros (n=401).
- **Estimaciones para Chile (según el mismo trabajo citado):**
 - **Co-kriging:** rango 24.182-28.201, con una estimación destacada de 26.083 cóndores.
 - **Monte Carlo:** media 23.130, IC95% 20.918-25.466.
- **Promedio entre ambas aproximaciones:** 24.605 cóndores; se infiere ~19.512 individuos maduros (por proporción de adultos).

CONSERVACIÓN

- **RCE (15° proceso):** el Comité (Acta Sesión N°05; 27 nov 2018) concluye CASI AMENAZADA (NT).
- **Fundamento consignado:** no cumple umbrales de categorías de amenaza UICN 3.1 por falta de información, pero información internacional indica declinación global en magnitud que no alcanza para "Vulnerable".
- En Chile, además, se indica que ha sido declarado Monumento Natural (DS N°02/06).

PRESENCIA EN ÁREAS PROTEGIDAS / RELEVANCIA: Parque Nacional Lauca, Volcán Isluga y Nevado Tres Cruces, Reserva Nacional Alto Loa.

