



AGOSTO
2026

VIZCACHA DE MONTAÑA

Un roedor andino asociado a formaciones rocosas, de actividad principalmente diurna y vida gregaria.

NOMBRE CIENTÍFICO: *Lagidium viscacia* (Molina, 1782)
NOMBRE COMÚN: Vizcacha de montaña
GRUPO: Mamíferos (Clase Mammalia)

FAMILIA: Chinchillidae
ORDEN: Rodentia
GÉNERO: *Lagidium*




¿CÓMO RECONOCERLA?

Rasgos clave:

• Pelaje suave y fino, con cambios parciales durante el año y tonalidad general gris (con variaciones desde amarillento/ocre a tonos más oscuros según condiciones).

- Cola con largos pelos en el dorso.
- Orejas (pabellones auriculares) largas y miembros posteriores muy desarrollados (adaptación a desplazamiento por rocas y saltos).



TAMAÑO:
Largo total: 550-800 mm
Cola: 230-400 mm
Tarso: 100-120 mm
Peso: 900-1.600 g



¿DÓNDE VIVE?

Distribución (Chile):

distribución discontinua, registrada en provincias como Parinacota, Antofagasta, Atacama, Elqui, Coquimbo, Valparaíso, San Felipe, Cordillera, Santiago, Cachapoal y Palena (17 localidades).

Rango altitudinal:

600 a 5.000 msnm.

Extensión de presencia (Chile):

396.862 km².

Distribución nativa:

Argentina, Bolivia, Chile y Perú.



HÁBITAT Y ECOSISTEMA

- Presente en diversos hábitats, pero típicamente en terrenos escarpados y rocosos.
- Para refugiarse, selecciona costados verticales de roca desnuda, a menudo con acumulación de bolones o lascas (microhábitats que entregan grietas y resguardo).
- La calidad del hábitat y la matriz circundante influyen en la ocupación de parches; el uso del hábitat parece estar más condicionado por el riesgo de depredación que por la disponibilidad de alimento.
- El movimiento a través de ríos sería limitado, lo que puede contribuir a una ocupación “por parches” dentro del paisaje.
- Es gregaria y de actividad diurna, preferentemente matinal y crepuscular, formando grupos que pueden ir desde pocos individuos a varios cientos; además, puede migrar a menor altitud cuando el clima se vuelve inclemente.



ALIMENTACIÓN:

- **Herbívora:** consume vegetales “duros” y ricos en celulosa (ej.: *Festuca*, *Stipa*, *Calamagrostis*, *Senecio*, *Parastrephia*, *Werneria*).
- También puede consumir alfalfa cercana a madrigueras.



POBLACIÓN Y MONITOREO:

Se describen poblaciones estables, aunque con bajas abundancias locales; pese a ser muy común, su distribución es irregular y las poblaciones pueden variar con el clima estacional extremo.



CONSERVACIÓN

- **RCE (Chile):** Preocupación Menor (LC), según acuerdo del Comité (Acta Sesión N° 01, 13 de septiembre de 2016).
- **UICN:** Preocupación Menor (LC) (publicado 2008); se indica amplia distribución, ocurrencia en áreas protegidas y se menciona que es cazada y que debiera evaluarse periódicamente el impacto de esa presión.
- **Normativa nacional:** incluida en el Reglamento de la Ley de Caza (DS 5/1998 MINAGRI); el texto reporta “En Peligro de Extinción según Ley de Caza” (zona de aplicación: Arica y Parinacota a Los Lagos).

PRESENCIA EN ÁREAS PROTEGIDAS / RELEVANCIA:

Parque Nacional: Lauca, Volcán Isluga y Nevado Tres Cruces; RN Los Flamencos, MN Salar de Surire, RN Alto Loa.

